MPHEABABRE

EL EUREPOPOHCERNO PYBEPHCENNA

BRHOMOCTHML

Nº 7.

H3BBCTIA

1. Солитерь у овець.

(:Оконтаніе:).

Насколько лать спустя, шаже бользиь и съ шакими же симпшомами, обнаружилась въ друговъ смадв. Какъ скоро показалась у нихъ сыпь вокругъ глазъ, я приказалъ давашь имъ тоже лекарство, й опо оказало столь хорошее двисшвіе, чшо изъ числа заболващихъ овецъ, умерло не болве двухъ и що самыхъ слабыхъ. Глисшовъ въ эшихъ овдахъ, замвчено было менве, нежели въ прежнихъ, пошому въронино, чио въ то время какъ имъ дано было лекарство, черви сін не совершение еще образовались, и раздробились въ желудки на болве мелкія части.

Прягошовление и количество приема

'лекарешва, сушь следующія: Расшопи З лоща апглійскаго олова на огив, пошомъ, снавъ его съ отия, шошчасъ же прибавь 1 лошъ ршуюн и разывшай деревинной палочкой. По охлаждения этой смвой, растолки ее въ мельзвой сшупъ; прибавъ 2 лоша сахора, п, какъ можно шщашельные, разотри вы каменпой ступь, покуда не обращится вся смвсь въ самый мвляій порошокъ, пакопець раздаля этомъ поротокъ на 32 равныя части; за неимвитемь совершение "вкримхъ въсковъ, можно, вивсто 2 лошовъ сахара взять 4, для того, чтобы въ кандонъ порошив было по золошнику Во всякомъ случав однакоже сахаръ пебходимъ, потому что безъ него нельзи мельо стереть норошковъ.

Эшого лекарошва падобно давашь, большимъ овцамъ, по одному порошку, за часъ до корысения ихъ, упромъ и вечеромъ, съ првбавкое одной ложки меду или сиропа и шощулсъ жепосле ито по 3, или 4 споловыя ложки крвикаго взвара изъ папорошинковаго кория и черемуховой коры; надобно замвшишь однавоже, что напорошниковый корень надобло брашь ощъ мужескаго расшенія. Это леченіе можно продолжать отъ двухъ до шрекъ дней: но молодымъ овнамъ должно давать не болве одного порошка въ день. За симъ, овцамъ, которыкъ еще не слабить, надобно дать пріемъ, состоящій изь 1 лота Глауберовой соли, распущенной въ менлой водв съ MACAR OHORNOO ABBRRATO MACAR, H если это провоевое чрезъ 6 или 8 часовъ не подвиствуеть, то такой же прістъ дапь еще разъ или болке, покуда неокажется желаеваго двиствія. Сверкъ втого, для повуждения овецъ къ вспражнению, еще въ продолжения насволькихъ дней, надобно ставить имъ по 2 или по 3 раза въ день шеплые клисширы изъ ромашки и мыла, съ прибавкою небольшаго количесшва вонючан. По окончанів леченія, надобно выгоньшь овець для насшвы на сочную шраву, и повшь водою съ прямисью отвара изъ можжевельника, горькаго влевера в сервовислаго железа, полатав на 10 штофовъ воды, 1 лотъ вшой смвен. Такимъ образомъ, больвыя "овцы, въ шеченія висколькихъ недваь совершенно поправляющся.

Насшоящую причину вшой болезия, я не уследь нейши, по полетею, что она происходить от взличниято кормления овечь, итать болес; что въ соседиемъ селения, озны, которыжа пасли въ продолнение ляшь, на одночь в шомъ же лугу, но не кормили брагою, осталить совершение здоровыми. Съно, конторымъ и кормилъ ихъ зимою, было шакже вегьма хороно, и шолько въ вачали ляша, когда начали показыванься уже первые признаки болязии, приказалъ и подкладывань имъ на ночь съно въ меньшемъ количествъ.

Соль, сшоль часшо даваемая овцамъ въ излешествъ, и могущая ослабить пищеварительные ихъ органы, - привела было меня, силчала шакже въ сомявніе; по пошомъ, узнавъ, что въ одномь миств, гдв соля почии вовсе не давали овцамъ, а даваля брагу и гдв больны глисшами шакже была запвчена, я еще сплыве убъдился въ моемъ мавији, швиъ болве, чшо приписать возвление ихъ испарениявь навоза, вт этомъ случав, никакъ было пельзя ибо вастуху спрого было приказац. о сохранени въ овчарив постоянно чиешаго воздуха и, по возножносши, ве болке 8 или. 10 градусовъ шенла no Peoniopy .-

Докшоръ Пімальць починаєть глявпою причиною зарожденія въ овцахъглясшовъ слабосшь мелудка, и вълящвее скопленіе, въ слафосшьіе этого, сля
зя въ немъ; віпр мивніе есть, кажетси, самое основащельное; по крайней
върв вежкій согласищем, что слабость
желудка можеть способетвевать развинію пачаль, производищихъ глисиы.
Весьма можеть быть щакже, что в
качество мелока матокъ способетвуєть вакопленію въ желудкь, у ме-

лодыхъ овець, слизи въ большемъ количесцивъ, пенели сколько овъ монешъ переварищъ, и чио слъдсивіемъ вшого ость ослабленіе пищеваришельныхъ органовъ.

Изъ всего этого можно вывеств заключение, что къ отвращению овисанвой бользии, всего исобходимве, какъ и при везкъ другихъ бользинкъ здоровая пяща.

(:Изв Белос. Област. Вед .:)

я. О прівосавшись и вывосавшись:

(съ у по 14 гисло Февраля 1842 года)

Прибыли: изъ Казани — Подполковвикъ Казимирскій и Мліоръ Колоникино, изъ Калуги — отс. Штабсъ Ротмистръ Сухотино, изъ Екатериноррга— Штабсъ - Каришанъ Розкильяфееб, изъ С. Пещербурга— Чиновникъ 12 власса Пахотовоб, изъ Кингицина — отс. Поручикъ Моиссеев в Коллежскій Регистраторъ Цишковв, остановилнов Кремлевской члети; изъ Москвы—Татулярной Совбинкъ Перволинв, изъ Вятки—Подпоручикъ Дунасев, остановились Ромдественской части; изъ Москвы—ото. Шишабяъ-Рошинстръ Дубровий, остановился Макарьевской части.

Выбжали въ С. Пешербургъ— Намегородскій Военвый Губернатора— Гевераль Лейтенавшь Бутуралью, Ротмистръ Графъ Стаксльберев, Подполвовникъ Казимирскій в Коллемскій Регестраторъ Нершесскій, въ Казавь— Маіоръ Колошкині, въ Квагивива— Маіоръ Калуенов, въ Моску— Гевераль-Маіоръ Князь Влзелскій в Коллежскій Ассесоръ Городецкій, въ Калуку— ИІшабсь-Ротинстръ Сухотинов, въ С. Петербургъ— Штабсъ Канивавъ Розкильдвеов, въ Пензу— Колломскій Солдетскій Регистраторъ Ушахоєв.